50-

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ___ N ___

Monsieur,

jepense queVous serés flatté, ainsy quetoutes les personnes illustres quicomposent lacademie dechirurgie, dapprendre unjeu delanature très singulier et quimerite lattention et ladmiration deceux qui seplaisent àlétudier. marguerille raquin agée detrente etquelques années femme de claude guillerand habitants de surgy ennivernois frontière debourgogne, est accouchée le dixhuit davril dunenfant àdeux tetes quiavécu uneheure edemie dont jay lhonneur devous fournir unmémoire.

cet enfant adeux tetes séparées lune delautre par unejuste proportion ellesont chaqune treizepouce edemis de circonference, leurs Visages repondent àleur grosseur, lafinesse et laregulariteé deleurs traits formoient des figures tres gracieuses.

ces deux tetes semblentetre placées sur deux corps quiontchaqu'un uneépine Vertébralle disposée obiquement pour sereunir àun seul coxis, unpeu plus large que dans un fœtus ordinaire. cependant ces deux corps sont unis si intimement quils nen composentquun; lun par la partie latéralle droite, et lautre par la partie latéralle gauche deleurs Vraies côtes, quisont cartilagineuses à leur jonction, et forment unsternum fort élevé, defaçon queces tetes neseregardent quobliquement

parderriere cecorps est unis par quatre productionsdecôtes, ouplutot par uneproduction des apophises transverses des quatre Vertébres dorsalles supérieuresdechaque épine, longue dechaque côté de dixhuit àvingt lignes, unies parunecartilage. cette production non seulement concoure àla formation de lapoitrine, mais empeche lesdeux epines Vertébralles

ARC 26 n° 47

de saprocher àleur partie supérieure. depuis cette production les deux épines ne sont separées que par la peau et les muscles jusques au coxis qui forme un seul bassin avec les os des illes et du pubis.

àla partie supérieure de la poitrine, se trouvent quatre bras, sçavoir deux placés aux parties lateralles, comme dans l'état naturel, et deux placés ala partiès postérieure: tous les quatre bien proportionés, bien articulés et bien mouvans, chaqu'un dans la cavité de l'omoplatte qui luy est propre

il n'a que deux jambes placées comme dans un sujet ordinaire très bien conformées dans toutes leurs parties, et semblent avoir receu de la nature une force de muscles proportionés àla grosseur du corps qu'elles devoient mouvoir.

dans la cavite de la poitrine tapissée dans toute son étendue par la plévre, et séparée en deux partiès par le médiastin, il sest trouvé un cœur, deux poûmons dont chaq'un navoit deux lobes, deux trachées artéres, deux œsophages.

le cœur, plus gros, que dans un fœtus ordinaire étoit envelopé d'un péricarde, on y remarquoit une aorte descendante et une ascendante de la crosse de laquelle naissoient quatre branches; j'aurois desire voire la distribution de ce quatrieme vaisseau, mais je n'ay pu dissequer entierement le sujet, parceq'uil apartient àdes gens peau vres qui veulent le garder pour en tirer quelque argent en le fesant voire aux curieux

chaque poûmon etoit composé de deux lobes; et il y avoit une trachée artère pour chaque poûmon qui repondoit àla bouche de chaq'une de ces têtes

deux œsophages qui commencoient depuis leurs bouches, et se continuoient jusques à un travers de doigt au dessus

du diaphragme où ils se réunissoient pour former l'orifice d'un seul ventricule situé dans la région epigastrique, lequel pouvoit contenir deux verres d'eau. tous les intestins n'avoient rien d'extraordinaire les uns étoient attachés au mésentéron et les autres au mésocolon, et s'étendoient ainsy jusqu'à l'anus. le foie fort gros, meme par raport au fœtus, etoit attaché au diaphragme, occupoit non seulement la partie de l'ypocondre gauche, mais encore la plus grande partie de la région épigastrique sans avoir rien de particulier

le pancréas n'avoit rien de remarquable, il étoit situé dans la région épigastrique le long de la partie inferieure du ventricule

la rate placée dans l'ipocondre gauche sous le ventricule paroissoit dans l'état naturel

les deux reins étoient situés dans les régions lombaires, l'un à droitte et l'autre à gauche de chaque epine vertebralle à une hauteur égalle un peu audessus des os des illes, et avoient chaqu'un une uretère qui alloit se décharger dans chaqu'un une vessie qui luy etoit particulière. ces deux vessies etoient placées dans le bassin, l'une antérieure attachée à l'os pubis, et l'autre postérieure attachée au rectum. l'uretère du rein droit se déchargeoit dans la vessie posterieure, et l'uretère du rein gauche dans la vessie antérieure; ces deux vessies se reunissoient à leur col pour ne former qu'une urèthre qui fait partie d'une seule verge, il n'y a qu'un scrotum garnis de deux testicules. j'aurois desiré satis faire plus amplement votre curiosité en poussant plus loing mes observations; vous scavés

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N

les motifs qui m'en ont empêché il est inutile de vous
les répéter. le defaut d'usage a bien pu me faire tomber
dans des fautes dont je ne me suis point apperçu, j'espere
que vous aurés assés d'indulgence pour me les passer, et
corriger mon ouvrage. si vous jugés àpropos de me
communiquer vos réflections à ce sujet, je feray en sorte
d'en profiter. ne me refusez pas, je vous prie cette grace
qui m'est d'un prix infiny, et que je n'oublieray jamais
plus que les sentimens respectueux avec les quels
j'ay l'honneur d'être, Monsieur,

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

Votre très humble et très obeissant
serviteur Dessous Lalande
Chirurgien

de clamecy ce 2 may 1763